

NOTICE

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

- Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est à dire utilisé sans consultation ni prescription d'un médecin.
 - Si les symptômes persistent au delà de 5 jours, s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
 - Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez la, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- NE LAISSEZ PAS CE MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS**

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE CETYLPIRIDINIUM LYSOZYME SANS SUCRE, comprimé à sucer édulcoré au sorbitol et à la saccharine et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE CETYLPIRIDINIUM LYSOZYME SANS SUCRE, comprimé à sucer édulcoré au sorbitol et à la saccharine ?
3. Comment prendre LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE CETYLPIRIDINIUM LYSOZYME SANS SUCRE, comprimé à sucer édulcoré au sorbitol et à la saccharine ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE CETYLPIRIDINIUM LYSOZYME SANS SUCRE, comprimé à sucer édulcoré au sorbitol et à la saccharine ?
6. Informations supplémentaires.



Boehringer
Ingelheim

SANS SUCRE,

Comprimé à sucer édulcoré au sorbitol et à la saccharine

chlorure de cétalpyridinium / chlorhydrate de lysozyme

1. QU'EST-CE QUE LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE CETYLPIRIDINIUM LYSOZYME SANS SUCRE, comprimé à sucer édulcoré au sorbitol et à la saccharine ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTI-SEPTIQUE LOCAL (R : système respiratoire)

Ce médicament contient du lysozyme et du cétalpyridinium.

Il est indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans en cas :

- de mal de gorge peu intense, sans fièvre,
- d'aphtes, de petites plaies de la bouche.

EN CAS DE DOUTE, NE JAMAIS HÉSITER À FAIRE APPEL À VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE CETYLPIRIDINIUM LYSOZYME SANS SUCRE, comprimé à sucer édulcoré au sorbitol et à la saccharine ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE CETYLPIRIDINIUM LYSOZYME SANS SUCRE, comprimé à sucer édulcoré au sorbitol et à la saccharine dans les cas suivants :

- enfant de moins de 6 ans,
- antécédents d'allergie à l'un des composants du médicament, dont allergie au lysozyme ou allergie à l'œuf.

Faites attention avec LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE CETYLPIRIDINIUM LYSOZYME SANS SUCRE, comprimé à sucer édulcoré au sorbitol et à la saccharine :

L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable car il est susceptible de modifier l'équilibre microbien naturel de la bouche, de la gorge.

Mal de gorge :

– En cas de survenue :

- de fièvre,
 - d'expectoration (crachats) purulente,
 - d'une gêne à la déglutition des aliments,
- comme en cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN.

Aphtes, petites plaies de la bouche :

– En cas :

- de lésions étendues,
 - d'extension des lésions,
 - d'apparition de fièvre.
- CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Ne pas utiliser en même temps plusieurs médicaments contenant un antiseptique.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE CETYLPIRIDINIUM LYSOZYME SANS SUCRE, comprimé à sucer édulcoré au sorbitol et à la saccharine :
Sorbitol (environ 1,3 g par comprimé).

3. COMMENT PRENDRE LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE CETYLPIRIDINIUM LYSOZYME SANS SUCRE, comprimé à sucer édulcoré au sorbitol et à la saccharine ?

N'utilisez pas ce médicament chez l'enfant de moins de 6 ans.

Posologie
RÉSERVÉ À L'ADULTE ET L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS.
En moyenne, 3 à 6 comprimés à sucer par jour, à laisser fondre dans la bouche et à répartir régulièrement dans la journée.

Mode d'administration
Voie buccale.

Fréquence d'administration
Les comprimés sont à sucer en respectant un délai minimum de 2 heures entre chaque prise.

Durée du traitement
La durée du traitement est limitée à 5 jours.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE CETYLPIRIDINIUM LYSOZYME SANS SUCRE, comprimé à sucer édulcoré au sorbitol et à la saccharine est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Des cas de réactions d'allergie ont été rapportés avec des médicaments contenant du lysozyme (substance active).

Effets indésirables de fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) : réaction allergique incluant œdème allergique.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE CETYLPIRIDINIUM LYSOZYME SANS SUCRE, comprimé à sucer édulcoré au sorbitol et à la saccharine ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée en clair sur l'emballage.

À conserver à une température ne dépassant pas + 30 °C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE CETYLPIRIDINIUM LYSOZYME SANS SUCRE, comprimé à sucer édulcoré au sorbitol et à la saccharine ?

Les substances actives sont :
Chlorure de cétylepyridinium 1,5 mg
Chlorhydrate de lysozyme 20,0 mg

Les autres composants sont :
Saccharine, stéarate de magnésium, arôme menthe*, sorbitol.

*Composition de l'arôme de menthe : huile essentielle de menthe poivrée, gomme arabique.

Qu'est ce que LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE CETYLPIRIDINIUM LYSOZYME SANS SUCRE, comprimé à sucer édulcoré au sorbitol et à la saccharine et contenu de l'emballage extérieur ?
Comprimé à sucer.
Boîte de 1 tube de 18 ou boîte de 2 tubes de 18 comprimés.

Titulaire / Exploitant
BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE
14 rue Jean Antoine de Baïf
75013 PARIS
FRANCE

Information médicale
Tél. : 03 26 50 45 33

Fabricant
DELPHARM REIMS
10, rue Colonel Charbonneaux
51100 REIMS
FRANCE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est juin 2013.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).



BOEHRINGER INGELHEIM France cotise à Adelphe, pour les emballages des médicaments vendus en officine. BOEHRINGER INGELHEIM France participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. BOEHRINGER INGELHEIM France vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacie.